EXÁMEN DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LÍNEA

CARRERA DE ENFERMERÍA

APLICACIÓN JUNIO 2021

1. En el centro de salud que está realizando su año de salud rural debe aplicar el componente de provisión de servicios del MAIS-FCI con la herramienta de la visita domiciliaria usted prioriza la visita a un niño menor de 1 mes ¿Qué criterio de priorización de la visita domiciliaria está aplicando?

Seleccione una:

a. Administrativa
b. Epidemiológica
c. Socioeconómica
d. Demográfica

Respuesta:

D: Demográfica

2. Julia de 24 años con 16 semanas de embarazo, acude a la unidad de salud ya que presenta manchas de sangre y contracciones sin dolor, está muy preocupada y expresa que anteriormente ha tenido dos abortos espontáneos. Seleccione los cuidados de enfermería que proporcionaría si usted está a cargo de la unidad:
   1. Valorar los sentimientos de la paciente sobre su actual embarazo
   2. Educar a la familia sobre los riesgos del embarazo
   3. Brindar apoyo individual y familiar
   4. Explicarle sobre el posible diagnóstico y necesidad de cerclaje
   5. Regresar a la paciente a casa, administrando supositorios uteroinhibidores
   6. Gestionar inmediatamente la trasferencia de julia a la unidad de salud de mayor complejidad.

Seleccione una:

a. 1,3,6
b. 2,3,5
c. 3,4,5
d. 1,4, 5

Respuesta:

A: 1, 3, 6

3. Paciente de 25 años que llega a emergencia tras sufrir accidente de tránsito, a la valoración se observa que al estímulo aprieta los dientes y estira los brazos, abduce e hiperpronan, las piernas se extienden con rigidez y flexión plantar de ambos pies. ¿Qué respuesta anormal motora presenta este paciente?

Seleccione una:

a. Decorticación
b. Opistotonos
c. Descerebración
d. Flacidez

Respuesta:

C: Descerebración

4. Como profesional de enfermería del centro de salud debe realizar visitas domiciliarias. La etapa de la visita que le ayuda para continuar o modificar las dificultades, revisar los objetivos, planificar otros nuevos, corresponde a:

a. Planificación de la visita
b. Preparación de la visita
c. Evaluación de la visita
d. Ejecución de la visita

Respuesta:

C: Evaluación

5. En la cirugía gastrointestinal se usan muchas técnicas comunes. Relacione la técnica con la respectiva definición.

TÉCNICA QUIRÚRGICA DEL APARATO DIGESTIVO	DEFINICIÓN
1. Resecar	a. Procedimiento por el cual se corta un tejido y separa de otro.
2. Seccionar	b. Procedimiento en el que una parte de un órgano se corta y se extrae del cuerpo
3. Anastomosar	c. Colocar una o más pinzas en ángulo recto sobre un tubo o un vaso.
4. Clamplear	d. Procedimiento en el que dos órganos huecos se unen quirúrgicamente

Seleccione una:
a. 1a, 2b, 3c, 4d
b. 1b, 2a, 3d, 4c

c. 1b, 2a, 3d, 4c
d. 1b, 2c, 3a, 4d

Respuesta:

C: 1b, 2a, 3d, 4c

6.- ¿Cómo se denomina el microorganismo que produce infección de trasmisión sexual en mujeres cuyas manifestaciones clínicas son: secreciones vaginales fétidas y prurito vulvar?

Seleccione una:

a. Cándida albicans
b. Trichomona Vaginalis
c. Gardnerella Vaginalis
d. Haemophilus Vaginalis

Respuesta:

B: Trichomona Vaginalis

7.-En el ciclo reproductivo femenino ocurren tres tipos de cambios simultáneos:

1. Segregación Ovulatoria
2. Estimulación de la hormona lutropina
3. Segregación hormonal
4. Estimulación de la folitropina
5. Segregación de la gonadotropina
6. Segregación Endometrial

Seleccione una:

a. 1, 3, 6
b. 1, 4, 5
c. 4, 5, 6
d. 2, 4, 6

Respuesta:

A: 1, 3, 6

8.-Los siguientes son materiales que se utilizan para lograr en el paciente una alineación corporal anatómica correcta EXEPTO:

Seleccione una:

a. Férula de yeso
b. Elevador de Hoyer
c. Tablero para pies
d. Sacos de arena

Respuesta:

B: Elevador de Hoyer

9.- ¿Cuál es el medio de diagnóstico para confirmar cambios en la celularidad compatible con cáncer de próstata?

Seleccione una:

a. Espermatograma
b. Ecografía
c. Biopsia
d. Biometría Hemática

Respuesta:

C: Biopsia

10.- Los enemas de limpieza tienen como objetivo eliminar las heces, para lo cual se usan varias soluciones. ¿Qué tipo de solución actúa mediante la extracción del líquido del espacio intersticial hacia el colon?

Seleccione una:

a. Isotónicas
b. Espuma
c. Hipertónica
d. Hipotónica

Respuesta:

C: Espuma

11.- La diferenciación o cambio progresivo de órganos y tejidos con adición y perfeccionamiento de sus funciones. Esta corresponde a:

Seleccione una:

a. Maduración
b. Desarrollo
c. Percentiles
d. Crecimiento

Respuesta:

B: Desarrollo

12.- Relacione los modelos conceptuales con sus teorizantes

Teorizantes	Modelos conceptuales
1. Dorothea Orem	a. Modelo de relaciones interpersonales
2. Hildegard Peplau	b. Déficit de autocuidado
3. Nola pender	c. Necesidad Humanas
4. Virginia Henderson	d. Modelo de la promoción de la salud

Seleccione una:

a. 1b, 2d, 3a, 4c
b. 1a, 2b, 3c, 4d
c. 1c, 2a, 3d, 4d
d. 1b, 2a, 3d, 4c

Respuesta:

D: 1b, 2a, 3d, 4c

13.- Al valorar a un paciente con antecedentes de tumor hepático, con coloración amarillento verdosa de la piel usted se encuentra ante una disfunción hepática conocida como:

Seleccione una:

a. Ictericia hepatocelular
b. Ictericia obstructiva
c. Hiperbilirrubinemia hereditaria
d. Ictericia Hemofílica

Respuesta:

B: Ictericia obstructiva

14.- Dentro del equipo de atención integral a víctimas de violencia de genero ¿cuál es la función del profesional de enfermería?

Seleccione una:

a. Valorar la situación social de la victima
b. Realizar el triaje inicial y tamizaje
c. Brindar atención clínica siguiendo los protocolos establecidos
d. Realizar contención emocional y proceso psicoterapéutico

Respuesta:

D: Realizar contención emocional y proceso psicoterapéutico

15.- Al realizar la medición de la presión venosa central (PVC), esta brinda información sobre.

Seleccione una:

a. Poscarga
b. Precarga
c. Resistencia vascular sistémica
d. Resistencia vascular pulmonar

Respuesta:

B: Precarga

16.- Recién nacido que al minuto de su nacimiento presenta llanto débil, tiene alteraciones de la frecuencia respiratoria, manos y pies azulados, su frecuencia cardiaca es de 80 por minuto, brazos y piernas con poco movimiento. De acuerdo con el caso ¿A qué puntaje de APGAR corresponde?

Seleccione una:

a. 0-3
b. 3-4
c. 7-8
d. 4-6

Respuesta:

B: 3-4

17.- ¿Cuál de las siguientes condiciones constituyen una causa prerrenal de la insuficiencia renal aguda?

Seleccione una:

a. Glomerulonefritis
b. Cálculos
c. Hemorragia
d. Pielonefritis

Respuesta:

B: Cálculos

18.- Señale las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso

Seleccione una:

a. Lesión eritematosa sobre la superficie de las articulaciones y debilidad muscular
b. Hipotensión arterial y creatinina sérica disminuida
c. Sensación exagerada de frio y fatiga extrema
d. Exantema en forma de mariposa

Respuesta:

A: Lesión eritematosa sobre la superficie de las articulaciones y debilidad muscular

19.- Según prescripción médica le piden administrar Fentanilo 50 microgramos, usted cuenta en el servicio con ampollas de 500 microgramos en 10 ml. ¿Cuántos ml debe administrar?

Seleccione una:

a. 5 ml
b. 1 ml
c. 2 ml
d. 10 ml

Respuesta:

B: 1 ml

20.- Al realizar la valoración de enfermería a un paciente con fracturas costales tras sufrir un accidente de tránsito presenta: disnea, deformidad en la pared torácica, uso de los músculos accesorios para respirar, falta de aliento y aleteo nasal. ¿A qué diagnostico enfermero corresponde este caso?

Seleccione una:

a. Limpieza ineficaz de las vías aéreas
b. Deterioro de la ventilación espontanea
c. Deterioro del intercambio de gases
d. Patrón respiratorio ineficaz

Respuesta:

D: Patrón respiratorio ineficaz

21.- ¿Cuál es la posición correcta para la toma de muestras de tamizaje metabólico neonatal?

Seleccione una:

a. Colocar al bebe de forma horizontal en posición prona en la camilla durante todo el procedimiento.
b. Colocar al bebé de forma horizontal en posición supina en la camilla durante todo el procedimiento
c. Colocar al bebé de forma horizontal durante todo el procedimiento sobre las piernas de quien lo sostenga
d. Colocar al bebé de forma vertical durante todo el procedimiento y de preferencia apoyado al pecho de quien lo sostenga.

Respuesta:

D: Colocar al bebé de forma vertical durante todo el procedimiento y de preferencia apoyado al pecho de quien lo sostenga.

22.- De las siguientes opciones, seleccione los efectos fisiológicos que tiene la aplicación de frio:

1. Reducción de la permeabilidad capilar

2. Efecto sedante

3. Efecto anestésico local

4. Vasoconstricción

5. Vasodilatación

6. Aumento de la permeabilidad capilar

Seleccione una:

a. 2, 3, 5
b. 2, 4, 6
c. 1, 5, 6
d. 1, 3, 4

Respuesta:

D: 1, 3, 4

23.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las características clínicas de la Glomerulonefritis?

Seleccione una:

a. Hematuria, edema, hipertensión arterial
b. Hiperalbuminemia, hipolipidemia, hipotensión arterial
c. Deshidratación, poliuria, hipertensión arterial
d. Hipotensión arterial, hematuria, Hiperalbuminemia

Respuesta:

A: Hematuria, edema, hipertensión arterial

24.- Seleccione el enfoque que le permite al ser humano desarrollarse en todas sus etapas de vida:

Seleccione una:

a. Enfoque de sexualidad integral
b. Enfoque de inclusión social
c. Enfoque de igualdad
d. Enfoque de interculturalidad

Respuesta:

C: Enfoque de igualdad

25.- Paciente acude al servicio de consulta externa por presentar incapacidad para ingerir alimentos, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso importante. Indique la etiqueta diagnostica prioritaria según la NANDA-I.

Seleccione una:

a. Déficit de autocuidado: alimentación
b. Patrón de alimentación ineficaz
c. Disposición para mejorar la nutrición
d. Desequilibrio nutricional ingesta inferior a las necesidades

Respuesta:

D: Desequilibrio nutricional ingesta inferior a las necesidades

26.- Relacione el tipo de dengue con las manifestaciones que correspondan:

TIPO DE DENGUE	MANIFESTACIONES
1. Sin signos de alarma	a.- Leucopenia
	b.- Náuseas y vómitos
2. Con signos de alarma	c.- Sangrado de mucosas
	d.- letargia, irritabilidad

seleccione una:

a. 1ad, 2bc
b. 1cd, 2ab
c. 1ab, 2cd
d. 1bc, 2ad

Respuesta:

D: 1bc, 2ad

27.- ¿Qué escala de valoración corresponde con las siguientes categorías de evaluación: estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia?

Seleccione una:

a. Escala de Macdems
b. Escala de Norton
c. Escala de Braden
d. Escala de Morse

Respuesta:

B: Escala de Norton

28.- ¿Qué condición debe reunir una paciente previa a la citología cervicovaginal?

Seleccione una:

a. Realizar el examen con la menstruación y emplear lubricantes durante el procedimiento
b. Abstinencia de relaciones sexuales y no realizarse la prueba durante la menstruación
c. Realizar tacto vaginal y lavado con ácido acético previo a la toma de muestra
d. Realizar colposcopia previa al examen y lubricar la vagina

Respuesta:

B: Abstinencia de relaciones sexuales y no realizarse la prueba durante la menstruación

29.- Seleccione las manifestaciones clínicas y cambios en el electrocardiograma del infarto agudo de miocardio.

1. Dolor torácico de inicio súbito

2. edema en extremidades inferiores

3. Elevación del segmento ST

4. Disnea paroxística nocturna

5. Elevación de la onda T

6. Piel húmeda diaforética, pálida

Seleccione una:

a. 1, 3 ,4
b. 1, 3, 6
c. 2, 4, 6
d. 4, 5, 6

Respuesta:

B: 1, 3, 6

30.- En la atención que se brinda en las consultas prenatales seleccione las acciones que se deben realizar durante el primer trimestre de embarazo:

1. Asesoría en planificación familiar

2. Determinar la tipología sanguínea

3. Control de frecuencia cardiaca fetal

4. Detectar preeclamsia mediante toma de TA

5. Anamnesis de violencia intrafamiliar

6. Calcular indice de masa corporal

Seleccione una:

a. 1, 3, 4
b. 1, 3, 6
c. 2, 4, 5
d. 2, 5, 6

Respuesta:

D: 2, 5, 6

31.- Indique cómo calcular la tasa de mortalidad:

Seleccione una:

a. Número de muertes ocurridas en un año dividido por la población total
b. Número de fallecidos por una enfermedad para número de fallecidos por todas las enfermedades.
c. Número de muertes debidas a una enfermedad especifica dividida por la población de riesgo en contraer esa enfermedad
d. Número observado de muertes para número esperado de muertes.

Respuesta:

A: Número de muertes ocurridas en un año dividido por la población total

32.- Relacione la terminología con los principales conceptos en el desarrollo de las teorías de enfermedades.

Terminología	Conceptos
1. Ciencia	a. Conjunto de conceptos que proyectan una visión sistémica de un fenómeno
2. Supuesto	b. Es una idea que se explica a través de la visualización simbólica y física
3. Teoría	c. Enunciados que se admiten como ciertos sin ninguna prueba o demostración
4. Modelo	d. Doctrina del conocimiento

Seleccione una:

a. 1d, 2c, 3a, 4b
b. 1d, 2c,3b, 4a.
c. 1c, 2a, 3b, 4d
d. 1a, 2d, 3b, 4c.

Respuesta:

A: 1d, 2c, 3a, 4b

33.- Identifique el reflejo del recién nacido que se realiza al desplazar nuestra mano a lo largo de la cara lateral de la planta de pie, cuya respuesta normal será el hiperextensión del dedo gordo y separación del resto de los dedos.

Seleccione una:

a. Reflejo de puntos cardinales
b. Reflejo de Babinski
c. Reflejo de prensión
d. Reflejo de moro

Respuesta:

B: Reflejo de Babinski

34.- Que medida general se debe implementar en un paciente de 3 años con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad.

Seleccione una:

a. Utilización de antitusígenos
b. Ofrecer líquidos
c. Brindar fisioterapia respiratoria
d. Administración precoz de antibióticos

Respuesta:

C: Brindar fisioterapia respiratoria

35.- En la valoración de la mama en una paciente de 15 años se observa elevación del pezón y aumento de la areola. Seleccione el estadio de Tanner que corresponde.

Seleccione una:

a. Estadio 2
b. Estadio 5
c. Estadio 4
d. Estadio 3

Respuesta:

D: Estadio 3

36.- Relacione el tipo de accidente vascular cerebral con las manifestaciones clínicas que corresponden.

TIPO DE ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL	MANIFESTACION CLINICA
1. Isquemico	a. Cefalea de tipo explosiva
2. Hemorrágico	b. Adormecimiento o debilidad en los músculos de la cara
	c. Trastornos visuales
	d. Disminución del nivel de conciencia

Seleccione una:

a. 1ac, 2bd
b. 1cd, 2ab
c. 1ad, 2bc
d. 1bc, 2ad

Respuesta:

D: 1bc, 2ad

37.- A qué principio fundamental del plan nacional de salud sexual y salud reproductiva hace referencia el enunciado; "toda la ciudadanía debe tener acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo a su necesidad"

Seleccione una:

a. Participación social
b. Confidencialidad
c. Equidad
d. Derechos humanos

Respuesta:

C: Equidad

38.- Como enfermera/o del servicio de urología usted debe brindar orientación a pacientes que egresan con sondas permanentes, entre las medidas, dietéticas esta orientar sobre el consumo de algunos alimentos que acidifican la orina para reducir el riesgo de infección de las vías urinarias. ¿Cuál de los siguientes alimentos son los adecuados para este tipo de pacientes?

Seleccione una:

a. Verduras y frutas
b. Frutas y productos lácteos
c. Legumbres y verduras
d. Cereales integrales y carnes

Respuesta:

D: Cereales integrales y carnes

39.- Seleccione los principios trasversales de la seguridad del paciente – usuario:

1. Atención centrada en la personal

2. Atención con autonomía y justicia

3. Liderazgo y trabajo en equipo

4. Administración correcta de medicamentos

5. visión sistémica y multicausal

6. identificación correcta del paciente

Seleccione una:

a. 2, 3, 5
b. 3, 4, 6
c. 1, 3, 6
d. 2, 4, 6

Respuesta:

D: 2, 4, 6

40.- Escolar de 6 años desde hace 3 semanas presenta rinorrea purulenta, tos productiva especialmente en la noche, congestión nasal persistente. En las mañanas presenta algo de disfonía, su madre refiere halitosis y cefaleas ocasionales ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

a. Sinusitis frontal aguda
b. Sinusitis maxilar aguda
c. Rinofaringitis aguda
d. Faringitis con adenolditis

Respuesta:

B: Sinusitis maxilar aguda

41. Paciente 3 gestas 2 cesáreas previas se encuentran en posparto inmediato con hemorragia vaginal. Clínicamente presenta dolor muy intenso a nivel de abdomen que cede un poco de forma repentina, shock y taquicardia sin expulsión de la placenta. ¿Cuál es la causa de hemorragia posparto?

Seleccione una:

a. Desgarro del canal de parto
b. Coagulopatía de consumo
c. Atonía uterina
d. Rotura uterina

Respuesta:

C: Atonía uterina

42. Un niño de 1 mes de vida es llevado a consulta con un pediatra por cuadro de una semana de evolución de vómito, inicio con vómitos posprandiales no biliosos de contenido lácteo; posteriormente los vómitos fueron más frecuentes y hace 24 horas son explosivos después de cada alimentación, niño conserva el apetito y llora de hambre. no ha presentado deposiciones diarreicas ni alzas térmicas, sus antecedentes natales incluyen parto vaginal espontaneo a las 39 semanas, sus puntajes de Apgar fueron 7 al primer minuto y 9 a los 5 minutos al examen físico FC: 135/min FR: 28/min TA: 70/50 mmHg, temperatura: 36,9°, el tórax es expansible con murmullo vesicular conservado, el abdomen con distención en hemiabdomen superior a la palpación profunda se palpa tumoración esférica de 1cm en epigastrio, la radiografía de abdomen muestra dilatación gástrica con escaso gas en asas intestinales distales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

a. Divertículo de Meckel
b. Estenosis hipertrófica del píloro
c. Enfermedad de Hirschprung
d. Hernia diafragmática congénita

Respuesta:

D: Hernia diafragmática congénita

43. Identifique la opción correcta sobre el manejo de electrolitos concentrados

Seleccione una:

a. Verificar que estén rotulados con etiqueta roja
b. Almacenar el sobrante en cada servicio
c. Administrar sin previa dilución
d. Administrar mediante microgotero

Respuesta:

A: Verificar que estén rotulados con etiqueta roja

44. Como profesional de enfermería usted atiende a un paciente al que se le coloco una sonda en T después de una intervención quirúrgica. El cirujano indica pinzar la sonda por una (1) hora antes y después de los alimentos ¿Cuál es el objetivo de esta indicación?

Seleccione una:

a. Detectar obstrucción del flujo biliar
b. Vaciar el contenido de la bilis
c. Evitar que acumule líquidos
d. Favorecer la digestión

Respuesta:

A: Vaciar el contenido de la bilis

45. En las enfermedades inmunoprevenibles como es la difteria. ¿Cuál es el tipo de muestras que se debe tomar?

Seleccione una:

a. Líquido cefalorraquídeo, sangre
b. Hisopado orofaringea, nasofaríngeo o de lesiones cutáneas
c. Orina, saliva o líquido cefalorraquídeo
d. Sangre, dependiendo de las condiciones del paciente: tejido hepático

Respuesta:

B: Hisopado orofaringea, nasofaríngeo o de lesiones cutáneas

46. Mujer de 52 años de edad llega al servicio de urgencias de un hospital, refiere que desde hace un día presenta fiebre con dolor en la parte baja del abdomen y espalda, disuria, malestar general, el médico le valora y solicita una toma de muestra de orina limpia, en la mitad de la micción ¿Qué intervención corresponde a la fase de planificación en el proceso de atención de enfermería en este caso?

Seleccione una:

a. Usar la asepsia quirúrgica, abrir el kit estéril o preparar los materiales estériles.
b. Proporcionar intimidad al paciente cerrada la puerta o la cortina
c. Evaluar el estado miccional del paciente
d. Explicar el procedimiento al paciente.

Respuesta:

B: Proporcionar intimidad al paciente cerrada la puerta o la cortina

47. Para calentar a un recién nacido hipotérmico se debe ajustar la temperatura de la incubadora por encima de la temperatura axilar del RN, en un máximo de:

Seleccione una:

a. 2.5°C
b. 1°C
c. 1.5°C
d. 2°C

Respuesta:

B: 1°C

48. ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponden con las características clínicas de la hepatitis C?

Seleccione una:

a. Presencia de heces oscuras y orina clara
b. No existe secuelas hepáticas en la infección crónica
c. Presencia de fiebre, inapetencia y dolor abdominal
d. Presenta un periodo de incubación de 14 a 21 días.

Respuesta:

C: Presencia de fiebre, inapetencia y dolor abdominal

49. ¿Qué coloración espera encontrar al examinar los loquios de una puérpera en el día once del posparto?

Seleccione una:

a. Roja
b. Rosada
c. Amarronada
d. Blanca

Respuesta:

D: Blanca

50. Seleccione la herramienta que corresponde a la siguiente definición.

"Son instrumentos técnicos y metodológicos que permiten conocer en la forma gráfica a los actores sociales, el proceso vivido por los actores locales, los factores de riesgo y de protección ambiental, estilos de vida sanitario y biológico"

Seleccione una:

a. Diagnostico situacional
b. Mapas parlantes
c. Sala situacional
d. Ficha familiar

Respuesta:

B: Mapas parlantes

51. ¿Qué escala de valoración corresponde con las siguientes categorías de evaluación; estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia?

Seleccione una:

a. Escala de Macdems
b. Escala de Norton
c. Escala de Braden
d. Escala de Morse

Respuesta:

B: Escala de Norton

52. Durante la atención comunitaria de un recién nacido de 28 días con lactancia materna, con cuadro de diarrea persistente sin signos de deshidratación ¿Qué recomendación alimenticia le recomendaría a la madre?

Seleccione una:

a. Mantener la misma frecuencia de alimentación sin variar alimentos y líquidos.
b. Incorporar jugos dulces que ayuden a evitar la desnutrición
c. Incorporar toma intermedia de agua para evitar la deshidración
d. Aumentar la frecuencia de lactancia materna por más tiempo cada vez.

Respuesta:

D: Aumentar la frecuencia de lactancia materna por más tiempo cada vez.

53. ¿Qué medida general se debe implementar en un paciente de 3 años de edad con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad?

Seleccione una:

a. Utilización de antitusígenos
b. Ofrecer líquidos
c. Administración precoz de antibióticos
d. Brindar fisioterapia respiratoria.

Respuesta:

D: Brindar fisioterapia respiratoria.

54. Mujer de 60 años, acude a consulta externa, manifiesta que, tras haber iniciado tratamiento para la hipertensión arterial, con fármaco que no especifica presenta edema de miembros inferiores. ¿Cuál de los siguientes medicamentos, produce este afecto secundario?

Seleccione una:

a. Labetalol
b. Losartan
c. Amlodipino
d. Enalapril

Respuesta:

C: Amlodipino

55. En el shock séptico del recién nacido pre termino hay intervenciones importantes que debe conocer el personal de salud. ¿Qué intervención se realiza en el minuto 0?

Seleccione una:

a. Dopamina 5 – 10 mcg/kg/min
b. Reconocer disminución de perfusión y cianosis
c. Epinefrina 0.05 a 0.3 mcg/kg/min
d. Corregir hipoglicemia o hipocalcemia iniciar antibióticos.

Respuesta:

B: Reconocer disminución de perfusión y cianosis

56. Una señora acude al centro de salud con su hijo de 7 meses y 0 días de edad, por control del niño sano, sus signos vitales con: Temperatura de 37.4°C, frecuencia cardiaca de 120/min; presión arterial 90/62mmhg; frecuencia respiratoria 40/min, al observar el carnet de vacunación verifica que tiene administrada las siguientes vacunas: pentavalente 3 dosis, Polio oral 3 dosis, neumococo dosis y Rotavirus 1 dosis, administrada a los 2 meses 10 días. ¿qué decisión debe tomar la enfermera con respecto a la vacuna rotavirus.

Seleccione una:

a. Suspender la administración porque es suficiente con una dosis.
b. Reiniciar el esquema de vacunación con la primera dosis y la segunda a las 2 semanas.
c. Debe administrarse la segunda dosis de rotavirus debido a su edad.
d. Al administrar rotavirus a esta edad podría causar invaginación intestinal.

Respuesta:

C: Debe administrarse la segunda dosis de rotavirus debido a su edad.

57. Asigne el diagnostico enfermero que corresponda a la siguiente definición, perdida súbita de orina que se produce con la actividad y que aumenta la presión intraabdominal.

Seleccione una:

a. Incontinencia urinaria funcional
b. Incontinencia urinaria refleja
c. Incontinencia urinaria por rebosamiento
d. Incontinencia urinaria de esfuerzo

Respuesta:

D: Incontinencia urinaria de esfuerzo

58. Al efectuar un estudio que relacione la frecuencia de un determinado problema de salud de una población general, con su exposición global a un factor de riesgo. ¿Cuál es el estudio epidemiológico que se debe realizar?

Seleccione una:

a. Correlacional
b. Transversal
c. Analítico
d. Descriptivo

Respuesta:

B: Transversal

59. Como profesional de enfermería atiende a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción médica indica administrar oxigeno por cánula nasal 3 litros por minuto. ¿Qué concentración de FIO2 está administrando con el volumen y dispositivo del caso?

Seleccione una:

a. 36%
b. 28%
c. 32%
d. 24%

Respuesta:

C: 32%

60. Relacione las disfunciones neurológicas que se observan en pacientes con accidente cerebro vascular cerebral con el cuidado de enfermería que corresponda.

DISNFUNCIONES NEUROLOGICAS EN PACIENTES CON ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL	CUIDADOS DE ENFERMERIA
1. Hemiplejia	a. Proveer al paciente de alternativas para comunicarse
2. Disartria	b. Mantener el cuerpo alineado en una posición funcional.
3. Ataxia	c. Colocar los objetos de cuidado personal en una misma localización
4. Diplopía	d. Instruir al paciente para que no camine sin asistencia.

Selecciones una:

a. 1b, 2a, 3d, 4c
b. 1c, 2d, 3b, 4a
c. 1d, 2c, 3a, 4b
d. 1a, 2b, 3c, 4d.

Respuesta:

A: 1b, 2a, 3d, 4c

61. La atención de salud de los adolescentes por parte de los profesionales de enfermería, debe enmarcarse dentro de los parámetros que posibiliten calidad y universalidad al brindar atención a un adolescente es necesario seleccionar en cada momento el apropiado enfoque para mantener, restablecer y mejorar la salud con un enfoque de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en funciones de las necesidades y/o riesgos.

¿A qué característica de la atención de calidad refiere en este caso?

Seleccione una:

a. Continua
b. Longitudinal
c. Integrada
d. Participativa

Respuesta:

C: Integrada

62. El gluconato de calcio es un fármaco muy utilizado en el servicio de neonatología su presentación farmacocinética es de 10 ml al 10% en su turno le piden administrar 125 mg IV cada 12 horas. ¿Cuál es la dosis que administra?

Seleccione una:

a. 0,5 ml
b. 1,0 ml
c. 0,75 ml
d. 1,25 ml

Respuesta:

D: 1,25 ml

63. Señale la medida preventiva primaria, en pacientes con factores de riesgo de trombosis venosa profunda.

Seleccione una:

a. Profilaxis de medicamentos dentro de las 48 horas
b. Inmovilización del paciente para evitar complicaciones
c. Vigilar el estado nutricional del paciente
d. Hidratación de la piel en la zona afectada.

Respuesta:

A: Profilaxis de medicamentos dentro de las 48 horas

64. Seleccione el tipo de vacuna que debe administrarse a un paciente con VIH/Sida con un recuento de CD4 mayor a 200 cél/mm3 y que su administración requiere 3 dosis (0,1, y 6 meses), recomendándose administrar una 4ta y 5ta dosis si no hay respuesta adecuadas.

Seleccione una:

a. Fiebre amarilla
b. Hepatitis B
c. Tétanos
d. Influenza estacional.

Respuesta:

B: Hepatitis B

65. Seleccione los diagnósticos de enfermería que se le pueden aplicar a las madres que estén sufriendo un parto hipertónico:

1. Falta de conocimiento relacionado con las contracciones uterinas secundarias al parto disfuncional.

2. Dolor relacionado con la incapacidad de la mujer para relajarse como consecuencia de las contracciones.

3.Adaptacion individual ineficaz relacionada con la ineficiencia de las técnicas de respiración.

4.Reconocer los problemas relacionados con la falta de información sobre el embarazo pos termino

5. Ansiedad relacionada con una progresión lenta del parto.

6.Riesgo le lesiones relacionadas con la dilatación.

Seleccione una:

a. 1, 2, 4, 5
b. 2, 3, 4, 5
c. 1, 3, 5, 6
d. 2, 4, 5, 6

Respuesta:

D: 2, 4, 5, 6

66. Cuál es la teorizante que habla de las condiciones y las fuerzas externas que influyen en la vida y el desarrollo de un organismo.

Seleccione una:

a. Ida Orlando
b. Betty Neuman
c. Florence Nigthingale
d. Dorothea Orem.

Respuesta:

B: Betty Neuman

67. Paciente ingresa al servicio de emergencia por trauma craneoencefálico, a la valoración de enfermería se observa que no abre los ojos bajo ninguna circunstancia, se le pregunta su nombre responde con palabras inapropiadas y al evaluar la respuesta motora presenta una flexión anormal (GLASGOW 7/15). ¿Cuál es el principal objetivo de enfermería en el manejo de este paciente?

Seleccione una:

a. Mantener la via respiratoria
b. Vigilar la función neurológica
c. Vigilar el equilibrio hidroelectrolítico
d. Prevenir lesiones.

Respuesta:

A: Mantener la via respiratoria

68. La inmunidad que se consigue cuando se administra una vacuna corresponde a:

Seleccione una:

a. Inmunidad natural activa
b. Inmunidad artificial activa
c. Inmunidad artificial pasiva
d. Inmunidad natural pasiva

Respuesta:

B: Inmunidad artificial activa

69. Al aplicar enemas de limpieza con el objetivo de eliminar las heces, se emplea varias soluciones ¿Qué tipo de solución estimula el peristaltismo aumentando el volumen en el colon e irritando la mucosa?

Seleccione una:

a. Isotónica
b. Hipertónica
c. Espuma
d. Hipotónica

Respuesta:

B: Hipertónica

70. Cuál de los siguientes fármacos altera la trasmisión de iones para prevenir la actividad convulsiva.

Seleccione una:

a. Manitol
b. Furosemida
c. Fenitoína
d. Propofol

Respuesta:

C: Fenitoína

71. Es un estudio que relaciona la frecuencia de un determinado problema de salud de una población general, con su exposición global a un factor de riesgo. ¿Cuál es el estudio epidemiológico que se debe realizar?

Seleccione una:

a. Analítico
b. Correlacional
c. Descriptivo
d. Transversal

Respuesta:

D: Transversal

72. ¿Cuál es la dosis de impregnación de sulfato de magnesio para el tratamiento de eclampsia?

Seleccione una:

a. 2 g intravenoso en 20 minutos
b. 2 g intravenoso en 60 minutos
c. 6 g intravenoso en 20 minutos
d. 6 g intravenoso en 40 minutos.

Respuesta:

C: 6 g intravenoso en 20 minutos

73. Identifique la opción correcta sobre el manejo de electrolitos concentrados.

Seleccione una:

a. Verificar que estén rotulados en etiqueta roja
b. Almacenar el sobrante en cada servicio
c. Administrar sin previa dilución
d. Administrar mediante microgotero.

Respuesta:

A: Verificar que estén rotulados en etiqueta roja

74. Indique el tipo de aprendizaje correspondiente a la técnica de simulación operativa.

Seleccione una:

a. De habilidad

b. De exposición
c. De Investigación
d. De análisis.

Respuesta:

A: De habilidad

75. Que recomendación emplearía para calentar a un recién nacido hipotérmico.

Seleccione una:

a. Aumentar la temperatura de la incubadora 5°C por encima de la temperatura del recién nacido.
b. Realizar el calentamiento rápido del recién nacido
c. Realizar el calentamiento lentamente entre 0,5° y 1°C por hora
d. Utilizar sueros calientes y botellas de agua.

Respuesta:

C: Realizar el calentamiento lentamente entre 0,5° y 1°C por hora

76. En la unidad de cuidados intensivos se encuentra un paciente que a la valoración de enfermería se observa respiraciones alternantes profundas rápidas y seguidas por periodo de apnea. ¿Cuál de los patrones de respiración corresponde con la descripción?

Seleccione una:

a. Respiraciones de Cheyne-Stokes
b. Respiraciones de Biot
c. Respiración Atáxica
d. Respiraciones de Kussmaul

Respuesta:

B: Respiraciones de Biot

77. Como profesional de enfermería usted brinda cuidados paliativos domiciliarios a un paciente que presenta cuadro de deshidratación a causa de abundantes vómitos. ¿Qué via de administración se utiliza como primera opción para la reposición de líquidos, ante la imposibilidad de obtener un acceso intravenoso?

Seleccione una:

a. Vía intramuscular
b. Vía oral
c. Via rectal
d. Via subcutánea

Respuesta:

C: Via rectal

78. Seleccione las vacunas que aplica tanto a los adolescentes como adultos que presentan infección por VIH con valores de linfocitos CD4 por debajo de 200 células por ml.

1. Influenza inactivada

2 Difteria tétanos

3.Fiebre amarilla

4.Antineumococica

5.Papiloma virus

6.Varicela Zoster

Seleccione una:

a. 1, 3, 5, 6
b. 1, 2, 3, 5
c. 1, 2, 4 ,5
d. 1, 4, 5, 6

Respuesta:

C: 1, 2, 4 ,5

79. Relacione el tipo de estilos de aprendizaje con sus características.

ESTILOS DE APRENDIZAJE	CARACTERISTICAS
1. Visual	a. Contacto sonoro
2. Kinestésico	b. Movimiento del cuerpo
3. Auditivo	c. Inspección directa
	d. Se basa en la escucha
	e. Experimentación
	f. Organizadores gráficos.

Seleccione una:

a. 1cf, 2be ,3da
b. 1bc; 2 ad, 3fe
c. 1fe, 2bc, 3ad
d. 1bc, 2ad, 3fe

Respuesta:

A: 1cf, 2be ,3da

80. Un paciente con sonda para aspiración gástrica y diarrea, presenta debilidad muscular y calambres según el cuadro descrito y los resultados de laboratorio: Na 135mEq/L, k 3.2mEq/L, Ca 8.9 mg/dl, Mg 1,8 mg/dL. ¿Qué trastorno electrolítico presenta el paciente?

Seleccione una:

a. Hipercalcemia
b. Hipopotasemia
c. Hipomagnesemia
d. Hipernatremia

Respuesta:

B: Hipopotasemia

81. Seleccione los principios trasversales de la seguridad del paciente – Usuario:

1. Atención centrada en la persona

2. Atención con autonomía y justicia

3. liderazgo, trabajo en equipo

4. Administración correcta de medicamentos

5. Visión sistémica y multicausal

6. Identificación correcta del paciente.

Seleccione una:

a. 2,3,5
b. 3,4,6
c. 1,3,5
d. 2,4,6

Respuesta:

D: 2,4,6

82. Relacione los tipos de sondas con sus indicaciones.

TIPOS DE SONDAS	INDICACIONES
1. Orogastrica	a. Está indicada en la nutrición enteral a largo plazo: estenosis esofágica, atresia de coanas
2. Nasogástrica	b. Se utiliza en neonatos con dispositivos de elección también en niños con facturas.
3. gastrostomía	c. Cuando se considera que la nutrición enteral es a corto plazo y no existe riesgo de broncoaspiración.

Seleccione una:

a. 1b,2c, 3a.
b. 1a, 2c, 3b
c. 3c, 2a, 3b
d. 1b, 2a, 3c

Respuesta:

A: 1b, 2c, 3a.

83. Relacione el tipo de insulina con la indicación que corresponda.

TIPO DE INSULINA	INDICACIONES
1. De acción rápida	A. Se administra 20 - 30 minutos antes de una comida.
2. De acción breve	B. Se usa para el tratamiento de hiperglucemia posprandial.
3. De acción intermedia	C. Se usa para la dosis basal
4. De acción muy prolongada	D. Se administra con alimentos.

Seleccione una:

a.1b, 2a, 3d, 4c

b. 1c, 2a, 3d, 4b

c. 1c, 2d, 3a, 1b

d. 1a, 2d, 3b, 4c

Respuesta:

A: 1b, 2a, 3d, 4c

84. Como enfermera/o de la comunidad, usted atiende un paciente con Tuberculosis Pulmonar. Como dato significativo de su historia psicosocial se destacan las malas condiciones socioeconómicas del paciente. ¿En cuál de las filosofías, teorías o modelos de Enfermería, se destaca este factor dentro del entorno como supuesto principal?

Seleccione una:

a. Filosofía de Virginia Henderson.
b. Filosofía de Florence Nigthingale.
c. Teoría de Nola J. Pender.
d. Teoría de Hildegard E. Peplau

Respuesta:

B: Filosofía de Florence Nigthingale.

85. Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido a término y de peso adecuado para la edad gestacional se administra profilácticamente:

a. 1 mg de gentamicina por vía intramuscular.
b. 0.5 cc de vitamina K por vía intravenosa lenta.
c. Dos gotas de colirio oftálmico en ambos ojos.
d. 1 mg de vitamina K por vía intramuscular.

Respuesta:

D: 1 mg de vitamina K por vía intramuscular.

86. Mecanismo de pérdida de calor corporal asociado a exposición de la piel y/o tracto respiratorio del recién nacido a una concentración de humedad menor a la necesaria. La definición que se menciona se refiere a:

a. Radiación.
b. Convección.

c. Evaporación.
d. Conducción.

Respuesta:

B: Convección.

87. Una escolar femenina de 9 años, llega al servicio de vacuna, la madre refiere que solo le aplicó las vacunas hasta 1 año. Señale que vacuna se debe aplicar según el esquema del MSP del Ecuador.

a. HPV.
b. Hepatitis B.
c. Trivalente viral.
d. DPT

Respuesta:

A: HPV.

88. La persona que presenta una muestra biológica positiva (BK), según el protocolo del MSP del Ecuador se le denomina:

a. Caso de TB pulmonar (TBP).
b. Caso de TB previamente tratado.
c. Caso de TB clínicamente diagnosticado.
d. Caso de TB bacteriológico confirmado.

Respuesta:

D: Caso de TB bacteriológico confirmado.

89. Las vacunas virales atenuadas al ingresar al organismo de un niño son capaces de producir una respuesta inmunológica sin causar daño; sin embargo, en algunos casos puede presentar complicaciones graves como:

a. Encefalitis, sordera.
b. Malestar general, sordera.
c. Cefalea, meningitis.
d. Dolor local, convulsiones.

Respuesta:

A: Encefalitis, sordera.

90. Identifique el tipo de variable en la cual solo pueden existir dos valores posibles:
   a. Nominal.
   b. Ordinal.
   c. Razón.
   d. Intervalo.

Respuesta:

A: Nominal

91. Determine la etiqueta diagnóstica de un paciente que está recibiendo tratamiento con suero salino isotónico por vía intravenosa, presenta edema periorbitario, dilatación yugular, sonidos respiratorios adventicios en la auscultación y balance de líquidos positivo.

Seleccione una:

A. Riesgo de desequilibrio en el volumen de líquidos.
B. Patrón respiratorio ineficaz.
C. Exceso en el volumen de líquidos.
D. Riesgo de déficit en el volumen de líquidos.

Respuesta:

A: Exceso en el volumen de líquidos.

92. Relacione los 5 momentos para el lavado de manos con sus finalidades, según la Organización Mundial de la Salud.

1. Antes del contacto directo con el paciente.	a. Para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies / objetos de entorno inmediato y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación.
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica.	b. Para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación.
3. Después de exposición a fluidos corporales.	c. Para proteger al profesional sanitario de la colonización o infección por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y de la subsiguiente propagación potencial.

4. Después del contacto con el paciente.	d. Para prevenir la transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como de un punto del cuerpo a otro del mismo paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.	e. Para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia al paciente y en última instancia proteger al paciente de la colonización.

Seleccione una:

a. 1d, 2c, 3b, 4a, 5e.
b. 1e, 2d, 3c, 4b, 5a.
c. 1c, 2b, 3a, 4d, 5e.
d. 1b, 2a, 3e, 4d, 5c.

Respuesta:

D: 1b, 2a, 3e, 4d, 5c.

93. Indique el nombre, vía y dosis de la vacuna que dentro del esquema de vacunación del Ecuador se aplica a los recién nacidos sanos durante las primeras 24 horas hasta los 11 meses 29 días:

Seleccione una:

a. HB, intradérmica, 0.05/1 ml.
b. BCG, subcutánea, 0.5 ml.
c. BCG, intradérmica, 0.05/0.1 ml.
d. HB, intramuscular, 0.5 ml.

Respuesta:

C: BCG, intradérmica, 0.05/0.1 ml.

94. La valoración nutricional proporciona información sobre enfermedades relacionadas con la nutrición. Relacione los componentes de la valoración nutricional con su correspondiente definición:

COMPONENTES DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL	DEFINICIÓN
1. Índice de masa corporal	a. Refleja la concentración en los tejidos de un determinado nutriente y alguna anomalía del metabolismo en la utilización de los nutrientes.
2. Evaluación bioquímica	b. Es útil para los pacientes adultos clasificados como portadores de peso normal o sobrepeso.
3. Circunferencia de la cintura	c. Sirven como indicadores del estado nutricional general y si la ingestión de nutrientes es adecuada.
4. Evaluación clínica	d. Es la relación basada en peso corporal y talla, cuyo resultado se compara con estándares establecidos.

Seleccione una:

a. 1c, 2d, 3a, 4b
b. 1a, 2c, 3d, 4b.
c. 1c, 2a, 3b, 4d.
d. 1d, 2a, 3b, 4c.

Respuesta:

D: 1d, 2a, 3b, 4c.

95. De acuerdo a la escala de Aldrette modificada, seleccione los indicadores para el alta de un paciente en la unidad de cuidados pos-anestésicos.

Seleccione una:

a. Mueve 4 extremidades, limitación en la respiración, presión arterial con variación del 25% de la cifra preanestésica, despierta al llamado, Sat O2 > 90% con oxígeno.
b. Mueve 4 extremidades, capacidad de respirar profundo y toser, presión arterial con variación del 20% de la cifra preanestésica, despierta al llamado, Sat O2 > 92% al ambiente.
c. Mueve 4 extremidades, limitación de la respiración, presión arterial con variación del 30% de la cifra preanestésica, despierta al llamado, Sat O2 > 90% con oxígeno.
d. Mueve 4 extremidades, limitación de la respiración, presión arterial con variación del 40% de la cifra preanestésica, despierta al ser llamado, Sat O2 > 92% con oxígeno.

Respuesta:
B: Mueve 4 extremidades, capacidad de respirar profundo y toser, presión arterial con variación del 20% de la cifra preanestésica, despierta al llamado, Sat O2 > 92% al ambiente.

96. Entre los cuidados transoperatorios, la enfermera circulante debe colaborar en la colocación del paciente en la posición correcta en la mesa quirúrgica según el tipo de intervención. ¿Qué posición utiliza previa una resección del colon sigmoideo?

Seleccione una:

a. Trendelemburg.
b. Decúbito lateral de Sims.
c. Decúbito ventral.
d. Trendelemburg invertida.

Respuesta:
B: Decúbito lateral de Sims.

97. Seleccione las modalidades de atención de los equipos integrales de salud según lo establecido por el MAIS- FCI:

1. Atención prehospitalaria.
2. Atención individual.
3. Atención extramural o comunitaria.
4. Atención en un establecimiento de salud.
5. Atención en establecimientos móviles de salud.
6. Atención al ambiente.

Seleccione una:

a. 3, 4, 5, 6.
b. 1, 3, 4, 5.
c. 1, 2, 3, 4.
d. 2, 3, 4, 6.

Respuesta:

B: 1, 3, 4, 5.

98. Las complicaciones que se pueden presentar en el puerperio son la hemorragia y el shock hipovolémico, frente a esto los cuidados de enfermería que se deben realizar y que irán encaminados a vigilar para prevenirlos son: la monitorización de constantes vitales, administración de fármacos, palpación del fondo uterino, control de diuresis, valoración de las mamas y la aparición de loquios. A qué clase de puerperio corresponden estos cuidados de enfermería:

Seleccione una:

a. Puerperio tardío.
b. Puerperio inmediato.
c. Puerperio mediato.
d. Reacción psicológica

Respuesta:

B: Puerperio inmediato.

99. La NANDA incluye algunas etiquetas diagnósticas para pacientes con problemas respiratorios. Relacione las etiquetas diagnósticas con las intervenciones de enfermería que correspondan.

ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS	INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
1. Limpieza ineficaz de vías aéreas.	a- Oxigenoterapia y control de su eficacia.
2- Deterioro del intercambio de gases.	b- Monitorización respiratoria.
3- Patrón respiratorio ineficaz.	c- Aspiración de las vías aéreas.
4- Riesgo de aspiración.	d- Incremento de la tos.

Seleccione una:
a. 1c, 2b, 3d, 4a.
b. 1b, 2a, 3d, 4c.
c. 1a, 2b, 3c, 4d.
d. 1d, 2c, 3a, 4b.

Respuesta:

A: 1c, 2b, 3d, 4a.

100. Relacione los sistemas de administración de oxígeno con las ventajas que correspondan.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO	VENTAJAS
1. Cánula nasal	a. Suministra concentración de O2 exacta, independientemente del patrón respiratorio con regulación de la FIO2
2. Mascarilla de Venturi	b. Gran libertad de movimientos, seguras, sencillas, no molestan para hablar ni para comer
3. Mascarilla simple de oxigeno	c. Dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones de oxígeno durante el traslado o en situaciones de urgencia, acumula oxígeno en cantidad suficiente para permitir el flujo sanguíneo
4.Mascarilla de oxígeno con Reservorio	d. Suministra concentraciones medianas de O2, los orificios laterales permiten la mezcla con el O2 del ambiente

Seleccione una:

a. 1c, 2d, 3a, 4b.
b. 1a, 2c, 3d, 4b.
c. 1b, 2a, 3d, 4c.
d. 1b, 2a, 3c, 4d.

Respuesta:

C: 1b, 2a, 3d, 4c.

101. Los profesionales de enfermería que otorgan atención familiar y comunitaria en el marco de la APS deben asumir una relación personal asistencial, basada en un cuidado de:

Seleccione una:

a. Longitudinalidad y Continuidad.
b. Planificación y Organización.
c. Efectividad y Eficiencia.
d. Promoción y Prevención.

Respuesta:
D: Promoción y Prevención.

102. De acuerdo a la guía de atención de labor de parto, parto y posparto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el parto es:

Seleccione una:

a. Una etapa en que la mujer requiere de apoyo de los profesionales de salud, ya que su vida y la de su hijo están en riesgo.

b. Un proceso de riesgo de vida para la madre y el niño/a, en que se recomienda tomar todas las medidas intervencionistas necesarias para evitar complicaciones.
c. Un proceso fisiológico, el cual debe ser respetado y en el que se deben ofrecer los estándares más altos de calidad de atención, limitando a lo mínimo las intervenciones.
d. Un proceso fisiológico en que madre e hijo saben qué hacer, por lo tanto, no es necesario el acompañamiento y vigilancia durante todo el proceso.

Respuesta:
C: Un proceso fisiológico, el cual debe ser respetado y en el que se deben ofrecer los estándares más altos de calidad de atención, limitando a lo mínimo las intervenciones.

103. Paciente masculino de 72 años, con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) grave y que requiere oxígeno complementario de por vida. Tras la administración de una concentración elevada de oxígeno comienza con un cuadro de Insuficiencia Respiratoria Aguda y Acidosis. ¿Cuál es la complicación que presenta el paciente?

Seleccione una:

a. Toxicidad del oxígeno.
b. Hipoxia hipoxémica.
c. Supresión de la ventilación.
d. Hipoxia histotóxica.

Respuesta:
A: Toxicidad del oxígeno.

104. El cloasma que se presenta durante el embarazo por lo general desaparece al término del mismo. Rosita de 30 años cursa su primer embarazo, muy preocupada acude a la unidad de salud indicando la aparición de manchas negras en su cara. Usted la tranquiliza diciendo que el problema es hormonal y que en el puerperio este problema desaparecerá, debido a que mejorará la piel por:

Seleccione una:

a. El aumento del lactógeno placentario.
b. La disminución del lactógeno placentario.
c. La disminución de estrógenos.
d. Elevación de estrógenos.

Respuesta:

C: La disminución de estrógenos.

105. El término Bioética apareció en 1970 y se define como: El estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención, examinada a la luz de los valores y de los principios morales, en su concepción básica, es ética para la vida. Del siguiente listado de opciones elija: ¿Cuál es la utilidad de la Bioética para el ejercicio de los profesionales de la salud?

A. Especifica normas, principios y procedimientos del comportamiento profesional.
B. Especifica normas y principios que protegen desde el punto legal al personal sanitario durante su ejercicio profesional.
C. Se ocupa de los deberes y de las tareas específicas de las diversas profesiones de salud.
D. suministra métodos de análisis basados en la argumentación y delibera sobre problemas concretos.

Respuesta:

A: Especifica normas, principios y procedimientos del comportamiento profesional.

106. Manuela ingresa al hospital con un embarazo a término más labor de parto, luego de una hora de su ingreso, es valorada. Durante la valoración el médico le dice que la va a examinar; la paciente se encuentra tímida e intenta cubrir su cuerpo con la sábana; el médico pide al estudiante de medicina que realice el tacto vaginal, la paciente se pone tensa y rígida, por lo que le llaman la atención para que colabore en el procedimiento que es necesario, luego el médico procede a comprobar la valoración realizada por el estudiante, la paciente continúa angustiada; la enfermera se encuentra junto a la paciente realizando su reporte. ¿cuál debe ser la actitud de la enfermera frente a esta situación?

Seleccione una:

a. Comunicar al jefe de servicio y luego del procedimiento dialogar con el médico y recordarle las normas de la valoración por tacto vaginal.
b. Explicar el procedimiento a la paciente y dialogar con el médico en privado recordándole la norma para evitar tactos numerosos.
c. Llamarle la atención al médico ese momento y recordarle la norma para la valoración por tacto vaginal.

d. Tomar la mano de la paciente para tranquilizarle y anotar lo observado en el expediente.

Respuesta:

B: Explicar el procedimiento a la paciente y dialogar con el médico en privado recordándole la norma para evitar tactos numerosos.

107. Usted es parte del personal de Enfermería de la sala de partos y recibe un recién nacido vigoroso, rosado, con Apgar 8 al minuto de vida, por lo que debe recibir cuidados rutinarios, aún se encuentra conectado a la placenta. Según la situación expuesta, ¿En qué momento debe pinzarse el cordón umbilical?

Seleccione una:

a. Cuando deje de pulsar (2 a 3 minutos).
b. Al minuto de nacido.
c. A los 45 segundos luego del nacimiento.
d. Inmediatamente después de nacer

Respuesta:

A: Cuando deje de pulsar (2 a 3 minutos).

108. Cuando ausculta los sonidos pulmonares de un niño con asma, ¿Qué sonido es más probable que perciba?
Seleccione una:

a. Crepitación.
b. Murmullo
c. Sibilancia.
d. Roce por fricción pleural.

Respuesta:

C: Sibilancia

109. Usted como personal de Enfermería de una sala de alojamiento conjunto debe realizar el baño al recién nacido. ¿Qué condiciones debe tener el recién nacido para realizarle este procedimiento?

Seleccione una:

a. Peso igual o menor a 2500g, independiente de la regulación de la temperatura.
b. Peso igual o mayor a 2000g, independiente de la regulación de la temperatura.
c. Peso igual o menor a 2000g y que haya regulado la temperatura.
d. Peso igual o mayor a 2500g y que haya regulado la temperatura.

Respuesta:

D: Peso igual o mayor a 2500g y que haya regulado la temperatura.

110. La colecistitis aguda es una inflamación de la vesícula biliar cuya causa primordial es la obstrucción del conducto cístico por un cálculo impactado. Los signos y síntomas principales son:

Seleccione una:

a. Dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, náuseas y vómito.
b. Acidez, epigastralgia, pirosis y regurgitación.
c. Dolor en el cuadrante superior derecho de abdomen, hematemesis y melenas.
d. Acidez, regurgitación o vómito, disfagia y llenura.

Respuesta:

A: Dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, náuseas y vómito.

111. La fototerapia es el tratamiento indicado para la ictericia y consiste en exponer la piel del niño a la luz fluorescente, de tal manera que se realice el metabolismo extrahepático de la bilirrubina, este procedimiento, aunque no produce complicaciones para el niño, si tiene efectos secundarios. Seleccione la opción de respuesta correcta que encierra estos efectos secundarios:

Seleccione una:

a) Deposiciones líquidas y verdosas, disminución de las pérdidas insensibles, síndrome del niño bronceado y enfriamiento.
b) Deposiciones líquidas y verdosas, aumento de las pérdidas insensibles, síndrome del niño bronceado y enfriamiento.
c) Deposiciones blandas y amarillas, aumento de las pérdidas insensibles y

sobrecalentamiento.
d) Deposiciones blandas y amarillas, disminución de las pérdidas insensibles y sobrecalentamiento.

Respuesta:

B: Deposiciones líquidas y verdosas, aumento de las pérdidas insensibles, síndrome del niño bronceado y enfriamiento.

112. Usted pertenece al personal de Enfermería de la sala de neonatología y recibe un recién nacido que tiene 35 semanas de edad gestacional, con un peso de 2400g y que se encuentra entre los percentiles 90 y 10. Usando la en general Taglia y Lubcheko, lo clasifica como recién nacido:

Seleccione una:

a) A término, peso bajo para la edad gestacional y peso bajo al nacimiento.
b) Pre término, peso adecuado para edad gestacional y peso bajo al nacimiento.
c) Pre término peso bajo para edad gestacional y peso bajo al nacimiento.
d) A término, con peso adecuado para edad gestacional y peso adecuado al nacer

Respuesta:

B: Pre término, peso adecuado para edad gestacional y peso bajo al nacimiento.

113. Carolina es una paciente primigesta de 23 años de edad, con un embarazo de 19 semanas de gestación, acude a su primera consulta prenatal. Durante la entrevista que sostiene el o la profesional de enfermería con Carolina, ella expresa cierta preocupación sobre la posibilidad de haberse expuesto a' Virus de Inmunodeficiencia Humana, afirma que ha tenido tres compañeros sexuales y que desconoce el número de compañeras sexuales de su pareja. Durante la consejería, ¿cuál de los siguientes estudios se debe realizar la paciente?

Seleccione una:

a. Interleuquina 6.
b. ELISA.
c. Número de células T.
d. Western Blot.

Respuesta:

B: ELISA.

114. Un niño con dificultad respiratoria y con tos perruna presenta signos asociados, ¿A qué condición?

Seleccione una:

a. Epiglotitis
b. Asma
c. Crup
d. Fibrosis Quística

Respuesta:
C: Crup

115. ¿Cuáles son los tres pilares en los cuales se basa el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 para minimizar las complicaciones propias de la enfermedad?
Seleccione una:

a. Medicación, dieta y antihipertensivos.
b. Dieta, ejercicio y analgésicos.
c. Actividad, alimentación y anticoagulantes
d. Dieta, ejercicio físico y medicación.

Respuesta:

D: Dieta, ejercicio físico y medicación.

116. En el Post Operatorio de colecistectomía por Laparoscopia, pueden producirse algunos signos de alarma, EXCEPTO:

Seleccione una:

a. Dolor irradiado hacia los hombros.
b. Ictericia leve.
c. Coluria.
d. Heces alcohólicas.

Respuesta:

A: Dolor irradiado hacia los hombros.

117. Un recién nacido tiene 20 horas de vida y nació a término, con peso adecuado para la edad gestacional. Su diagnóstico clínico inicial es ictericia por incompatibilidad ABO, para su tratamiento el niño debería ser colocado en Fototerapia de luz fluorescente. Para lo cual usted como profesional de Enfermería debería tomar en cuenta algunos aspectos para optimizar el cuidado del niño que se encuentra en fototerapia. Elija el literal correspondiente:

Seleccione una:

a. Colocar al niño cubierto con pañal, escarpines y gorro, protección ocular y genital si es varón y a una distancia de 20 a 45 cm de distancia.
b. Colocar al niño completamente desnudo, con protección ocular y genital en caso de ser varón y a una distancia de la luz de 45 - 60 cm distancia.
c. Colocar al niño completamente desnudo y a una distancia de 20 a 45cm.
d. Colocar al niño con ropa liviana con protección ocular y genital si es varón y a una distancia de la luz de 45 a 60 cm de distancia.

Respuesta:

B: Colocar al niño completamente desnudo, con protección ocular y genital en caso de ser varón y a una distancia de la luz de 45 - 60 cm distancia.

118. Un paciente con hemorragia subaracnoidea llega a emergencia con las siguientes características: estupor, hemiparesia derecha y rigidez de descerebración temprana. ¿según la escala de Hunt y Hess qué grado de severidad presenta?

Seleccione una:

a. Grado IV.
b. Grado V.
c. Grado II.
d. Grado III.

Respuesta:

A: Grado IV.

119. La compresión de la vena cava dada por el aumento de tamaño del útero y su contenido produce cambios en el sistema cardiovascular produciendo la reducción del volumen sanguíneo que llega al corazón. Determine, ¿Qué signos se producen en el embarazo, secundarios al efecto antes mencionado?

Seleccione una:

a. Gasto cardiaco normal, Síndrome supino hipotenso.
b. Taquicardia, Síndrome supino hipotenso.
c. Gasto cardiaco normal, Acidosis respiratoria.
d. Taquicardia, Acidosis respiratoria.

Respuesta:
B: Taquicardia, Síndrome supino hipotenso.

120. Durante la alimentación de un neonato se debe conocer su capacidad gástrica, bajo esta premisa calcule la capacidad gástrica inicial de un niño que pesa 3500g.
Seleccione una:

a. 30 CC.
b. 32 CC.
c. 38 CC
d. 35 CC

Respuesta:

B: 32 CC.

121. Paciente de 45 años, ingresa a Emergencia con signos de shock hipovolémico por sangrado. Usted como enfermera/o canaliza una vía intravenosa de grueso calibre para reposición de líquidos. En este caso, se pueden administrar las siguientes soluciones, EXCEPTO:

Seleccione una:

a. Plasma.
b. Solución Glucosada al 5%.
c. Lactato de Ringer
d. Sangre

Respuesta:
B: Solución Glucosada al 5%.

122. Los síntomas cardinales de la diabetes tipo 2 son:

Seleccione una:
a. Poliglobulia, policitemia y poliposis.
b. Probables, certeros y de presunción.
c. Hematemesis, hemoptisis y melenas.
d. Poliuria, polidipsia y polifagia.

Respuesta:
D: Poliuria, polidipsia y polifagia.

123. Cuál de las siguientes arritmias, es considerada un ritmo de paro letal:

Seleccione una:

a. Flutter auricular.
b. Fibrilación auricular.
c. Fibrilación ventricular
d. Taquicardia sinusal

Respuesta:

C: Fibrilación ventricular

124. Un recién nacido tiene 20 horas de vida y nació a término con peso adecuado para la edad gestacional. Su grupo sanguíneo es ARH+ y es hijo de una madre ORH+. Al momento se encuentra con ictericia en zona 2 según la escala de Kramer y presenta Bilirrubinas totales de l5mg/dl a expensas de la bilirrubina indirecta. El resto del examen físico del recién nacido es normal. Con base en la situación presentada, de las siguientes opciones determine la probable complicación del niño:
Seleccione una:

a. Ictericia por incompatibilidad ABO.
b. Ictericia multifactorial
c. Ictericia fisiológica.
d. Ictericia por incompatibilidad de factor.

Respuesta:

A: Ictericia por incompatibilidad ABO.

125. Pedro de 70 años, con intenso dolor en su rodilla izquierda acude a una unidad de salud se diagnostican artritis y escoliosis severa. El plan de tratamiento médico incluye antinflamatorios, analgésicos y vitaminas. En la valoración de enfermería usted identifica: alteración del patrón funcional actividad y ejercicio, por lo que decide evaluar la funcionalidad. De las siguientes opciones ¿Qué instrumento validado internacionalmente y descrito en la guía de atención integral del adulto mayor del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, utiliza para evaluar la función de movilidad de Pedro?

Seleccione una:

a. índice de Pfeiffer modificado.
b. Índices de Yesavage modificado.
c. índice de Katz o Lawton y Brody modificado.
d. Índices específicos de la historia clínica única.

Respuesta:

C: índice de Katz o Lawton y Brody modificado.

126. La gastroenteritis es una inflamación intestinal caracterizada por diarrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos. ¿Cuál sería el protocolo de tratamiento inicial a seguir durante estos casos?

Seleccione una:

a. Coprocultivo, administración antibiótica y monitorización de signos vitales.
b. Reposición hídrica, información nutricional y educación para la prevención.
c. Reposición hidroelectrolítica, mejorar los síntomas y controlar la infección.
d. Toma de muestras de laboratorio, vacunación y fomento del descanso.

Respuesta:
C: Reposición hidroelectrolítica, mejorar los síntomas y controlar la infección.

127. Un aspecto importante en el cuidado del recién nacido enfermo es procurar periodos largos de reposo y sueño. Seleccione la opción que indique lo que debe realizar el personal de Enfermería para lograr este efecto:

Seleccione una:

a. Disminuir la intensidad de luz y monitorización manual continua.
b. Manejo continúo y disminuir el ruido innecesario.
c. Manejo mínimo, disminuir las luces y ruido innecesario.
d. Manejo continúo y disminuir la intensidad de las luces.

Respuesta:

C: Manejo mínimo, disminuir las luces y ruido innecesario.

128. El drenaje torácico garantiza la salida de aire o exudados acumulados en la cavidad pleural. Ante un paciente procedente del quirófano con drenaje torácico, seleccione qué signo indica un mal funcionamiento del sistema de drenaje:

Seleccione una:

a. La fluctuación del drenaje con presencia de 70 ml/h en la cámara durante la inhalación.
b. Ausculta fluctuación del drenaje del interior de la cámara durante la inhalación o exhalación.
c. La fluctuación del drenaje con presencia de 50ml/h en la cámara en exhalación.
d. La fluctuación del drenaje y del agua durante la inhalación o la exhalación.

Respuesta:

B: Ausculta fluctuación del drenaje del interior de la cámara durante la inhalación o exhalación.

129. Relacione las alteraciones en el nivel de conciencia con sus definiciones.

ALTERACIONES DEL NIVEL DE CONCIENCIA	DEFINICIONES
1. Confundido	a. Estado de somnolencia profundo y prolongado, procesos de pensamiento enlentecidos.
2. Letárgico	b. Estado patológico que se caracteriza por la pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la motricidad.
3. Obnubilado	c. Desorientado temporal, espacial y persona con dificultad para seguir órdenes.
4. Estuporoso	d. Alteración en la que disminuye el nivel de conciencia, lentitud psicomotora, despierta con estímulos persistentes.
5. Coma	e. Solo despierta ante estímulos dolorosos, con localización adecuada del mismo y respuesta verbal incomprensible.

Seleccione una:

a. 1e, 2c, 3b, 4a, 5d
b. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e
c. 1c, 2a, 3d, 4e, 5b
d. 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Respuesta:
C: 1c, 2a, 3d, 4e, 5b

130. Usted está a cargo de la administración de un servicio y tiene déficit de personal de enfermería, debe realizar una propuesta para incremento de talento humano. ¿Cuál es la acción inicial para la resolución de este problema según las fases de del proceso administrativo?

Seleccione una:

a. Selección de talentos que deseen trabajar en su servicio y tengan competencia.
b. La planeación con la definición de los objetivos del proceso.
c. Reclutamiento de talento humano según la cantidad solicitada el año anterior.
d. Redistribución de los recursos existentes para cubrir la demanda.

Respuesta:
D: Redistribución de los recursos existentes para cubrir la demanda.

131. La funcionalidad de la familia depende de la capacidad adaptativa de los recursos que han acumulado a lo largo de su ciclo vital. A continuación, se plantea el siguiente caso: La familia Pérez-Acosta es una familia con hijos adolescentes, uno de ellos de 16 años, tiene su primera decepción sentimental. Esta familia se rige por normas de funcionamiento interno, que regulan las relaciones entre sus miembros. Los padres indican que al inicio fue complicado, pero ahora se han adaptado a esta nueva etapa de la vida. Indique en qué estadio se encuentra esta familia:

Seleccione una:

a. Equilibrio patológico.
b. Disfunción familiar.
c. Familia en crisis.
d. Familia Normofuncional.

Respuesta:
D: Familia Normofuncional.

132. Luego de haber sido reconstituidas las vacunas SRP multidosis, SR, BCG y Antiamarílica pueden continuar utilizándose por un período máximo de:

Seleccione una:

a. 12 horas y descartar.
b. 6 horas y descartar.
c. 8 horas y descartar.
d. 2 horas y descartar.

Respuesta:

B: 6 horas y descartar.

133. Relacione correctamente el nombre de las autoras con las categorías conceptuales de las teorías de enfermería:

1.Myra Levine	a. La enfermería "consistía en hacerse responsable de la salud de las personas" y lo planteó en "Notas de Enfermería".
2.Florence Nightingale	b. La enfermería se define "como una práctica del cuidado, cuya ciencia sigue una moral y una ética del cuidado y la responsabilidad".
3.Patricia Benner	c. La enfermería se define como "proceso fundamental para las enfermeras y para otras tareas propias del cuidar", en donde el cuidar implica preocuparse por un semejante.
4.Kari Martinsen	d. La enfermería tiene como objetivo "promover la adaptación y mantener la globalidad a través de la interacción humana".

Seleccione una:

a. 4c, 3b, 2a, 1d.
b. 1c, 4b, 2a, 3d.
c. 3c, 2b, 4d, 1 a.
d. 1b, 2c, 4d, 3 a.

Respuesta:

A: 4c, 3b, 2a, 1d.

134. Marlene es una enfermera que ejerce el liderazgo en el servicio de obstetricia, se caracteriza por: tomar decisiones sin participación del grupo, asignar trabajo sin ofrecer explicación, es dominante, personaliza los elogios y las críticas al grupo. De acuerdo con la teoría de los estilos de liderazgo, Marlene, ¿Qué tipo de liderazgo es?

Seleccione una:

a. complaciente.
b. Liberal.
c. Autocrático.
d. Democrático.

Respuesta:

C: Autocrático.

135. Salomé es una paciente hospitalizada con diagnóstico de embarazo de 29 semanas más diabetes gestacional. Dentro de las actividades interdependientes de enfermería consta la gestión de exámenes de laboratorio, estudios clínicos e interconsultas que se requieren para

la paciente durante su permanencia en el hospital. A continuación, se enuncian exámenes, estudios e interconsultas necesarios para el tratamiento de Salomé que debe gestionar la enfermera, EXCEPTO:
Seleccione una:

a. Elemental y microscópico de orina.
b. Hemoglobina glicosilada.
c. Insulino terapia.
d. Interconsulta a nutrición y dietética.

Respuesta:
C: Insulino terapia.
136. La enfermera del dispensario médico de una fábrica que produce madera debe procesar datos con respecto a la enfermedad por la que los trabajadores decidieron renunciar, ¿Cuál de las medidas de tendencia central debe calcular para conocer la enfermedad más frecuente por la que los trabajadores renuncian?

Seleccione una:

a. Media
b. Mediana
c. Moda
d. Varianza

Respuesta:
C: Moda

137. El hipotiroidismo es el resultado de la hipersecreción de las hormonas tiroideas triyodotiroxina (T3) y la tetrayodotiroxina (T4) cuyas manifestaciones clínicas son:

Seleccione una:

a. Irritabilidad, nerviosismo, intolerancia al calo, pérdida de peso, taquicardia y diarrea.
b. Ansiedad, irritabilidad, depresión, fotofobia, hipotensión, broncoespasmos y convulsiones.
c. Fatiga, anorexia, náusea, vómito, epigastralgia, pérdida de peso, hipertensión y constipación.
d. Letargia, fatiga, debilidad, intolerancia al frío, ganancia de peso, bradicardia y constipación.

Respuesta:

D: Letargia, fatiga, debilidad, intolerancia al frío, ganancia de peso, bradicardia y constipación.

138. Ligia es una enfermera que acaba de asumir el liderazgo de la consulta externa de un hospital de segundo nivel y encuentra que en el servicio hay múltiples problemas que resolver. ¿Qué tipo de planificación debe aplicar para intervenir en el servicio?

Seleccione una:

a. Estratégica.
b. Operativa.
c. Institucional.
d. De producción.

Respuesta:
A: Estratégica

139. La meta del modelo de Virginia Henderson es:

Seleccione una:

a. La indiferencia del paciente y su familia.
b. El máximo grado de crecimiento personal del paciente.
c. La adaptación del paciente al medio ambiente.
d. La identificación de las necesidades humanas básicas.

Respuesta:
D: La identificación de las necesidades humanas básicas.

140. En el proceso normal del envejecimiento a nivel del sistema nervioso central se producen ciertos cambios, EXCEPTO:

Seleccione una:

a. Alteración de la percepción sobre la cantidad y calidad del sueño.
b. Alteraciones en la velocidad de respuesta y reacción.
c. Disminución progresiva de la atención y del aprendizaje.
d. Pérdida de la memoria y modificación grave del carácter.

Respuesta:
D: Pérdida de la memoria y modificación grave del carácter.

141. Elija la respuesta correcta. ¿Cuál es el sitio con más rápido absorción para la administración de insulina?

Seleccione una:

a. Región peri-umbilical.
b. Glúteos.
c. Anterior del brazo.
d. Cara antero lateral del músculo vasto externo.

Respuesta:

A: Región peri-umbilical.

142. Relacione los factores de riesgo con las observaciones realizadas a la familia en la visita domiciliaria:

FACTORES DE RIESGO	OBSERVACIONES DE LA VISITA
1. Riesgo biológico	A, Madre soltera
2. Riesgo Socio-económico	b. Enfermedad diarreica
	c. Rechazo a la lactancia
	d. Embarazo no deseado

Seleccione una:

a. 1bc; 2ad.
b. 1ad; 2bc.
c. 1ab; 2cd.
d. 1bd; 2ac.

Respuesta:

A: 1bc; 2ad.

143. Como parte de la educación del paciente con colostomía, se enseña sobre el recambio de la bolsa de ostomia, para realizar el corte en la parte posterior del equipo, usted indica que la apertura debe ser más grande que la estoma en:

Seleccione una:

a. 6mm
b. 1mm
c. 3mm
d. 5mm

Respuesta:
C: 3mm

144. Al realizar un proceso enfermero en la promoción de la salud en la etapa de planeación. ¿Cuál de los siguientes pasos debe seguir, según Nola Pender?

Seleccione una:

a. Detectar los factores de riesgo
b. Identificar los objetivos de cuidados de salud.
c. Identificar los estilos de vida
d. Determinar creencias sobre la salud.

Respuesta:
A: Detectar los factores de riesgo

145. Identifique el mecanismo fisiopatológico de la disnea en la neumonía.
Seleccione una:

a. Cuerpo extraño en la luz de los bronquios
b. Reacción de hipersensibilidad bronquial
c. Reacción inflamatoria a nivel alveolar
d. Perdida de la presión negativa en la cavidad pleural

Respuesta:

C: Reacción inflamatoria a nivel alveolar

146. Paciente de 9 años que durante sus 5 días de hospitalización presenta fiebre, al revisar el registro diario de la temperatura se observa un ascenso menor de 1°C en cada día, este patrón de fiebre se conoce como:
Seleccione una:

a. Fiebre continua
b. fiebre intermitente
c. fiebre recurrente
d. Fiebre remitente

Respuesta:
A: Fiebre continua

147. Relacione las vías de administración con las características a las que correspondan:

VIAS DE ADMINISTRACIÓN	CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE ABSORCIÓN
1- Via oral	a. la superficie de la absorción es altamente vascularizado.
2- Via sublingual	b. Se absorbe a través de los capilares sanguíneos
3- Via intramuscular	c. Superficie de la absorción extensa, debido al grosor de la capa mucosa
4- Via subcutánea	d. escasa vascularización y su absorción es más lenta.

Seleccione una:

a. 1a, 2b, 3c, 4d.
b. 1c, 2a, 3b, 4d.
c. 1b, 2c, 3d, 4a.
d. 1d, 2a, 3c, 4b.

Respuesta:

D: 1d, 2a, 3c, 4b.

148. la administración de un fármaco de tal forma que se logre una concentración estable en el organismo se conoce como:

Seleccione una:

a. Dosis media
b. Dosis de mantenimiento
c. Dosis de carga
d. Dosis mínima.

Respuesta:

B: Dosis de mantenimiento

149. Paciente que confirma diagnóstico de tuberculosis se decide iniciar tratamiento de TB sensible, seleccione la dosis de la fase inicial y la fase de consolidación para este caso:

Seleccione una:

a.75 dosis HRZ (3 meses)
b. 50 dosis HRZ (2 meses) y 100 dosis HR (4 meses)
c. 55 dosis HRZE (3 meses)
d. 50 dosis HRZ (2 meses)

Respuesta:

B: 50 dosis HRZ (2 meses) y 100 dosis HR (4 meses)

150. Los siguientes son parámetros del sistema de puntuación de alerta temprana de morbilidad materna score MAMA, EXCEPTO:

Seleccione una:

a. frecuencia cardiaca y sato2

b. Glicemia y hematuria

c. Estado de conciencia y proteinuria

d. Presión sistólica y presión diastólica.

Respuesta:

B: Glicemia y hematuria